RECOMENDACIONES TRAZADORAS

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA (GPC) PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO Y MANEJO INICIAL DE LA NEUMONÍA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS
Diagnóstico de neumonía en menores de 5 años
Se recomienda usar la definición de caso de neumonía de AIEPI (atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia): niño con tos o dificultad para respirar, que no presenta ningún signo general de peligro ni tiraje subcostal o saturación baja de oxígeno (Saturación de O2 al aire ambiente <92% (o <90% si vive en una altura superior a 2.500 msnm) Se recomienda practicar la oximetría de pulso en niños menores de 5 años con neumonía
Tratamiento - uso de antibiótico
Se recomienda usar la amoxicilina oral en dosis de 90 mg/kg/día durante 5 días en todo menor de 5 años atendido ambulatoriamente con diagnóstico de neumonía y evidencia de consolidación neumónica en la radiografía simple del tórax.
Se recomienda usar la amoxicilina oral a dosis de 90 mg/kg/día durante 5 días, en todo menor con diagnóstico de neumonía y sin acceso a la radiografía simple del tórax.
Punto de buena práctica: se recomienda en todo menor con diagnóstico de neumonía tratado con amoxicilina a 90 mg/kg/día y que presente aparición de signos de peligro, tiraje, cianosis o estridor en las siguientes 72 horas de inicio del tratamiento, clasificarlo como neumonía grave, remitirlo a un lugar de mayor complejidad y usar amoxicilina con ácido clavulánico a dosis altas (90 mg / kg al día amoxicilina) por 5 días.