

FICHA TÉCNICA INDICADORES INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Realización de pruebas rápidas a mujeres con factores de riesgo para C. trachomatis y N. gonorrhoeae
Definición del indicador	Proporción de pruebas rápidas realizadas a mujeres con factores de riesgo para C. trachomatis y N. gonorrhoeae en el sitio de atención
Objetivo del indicador	Identificar la cantidad de mujeres con factores de riesgo para C. trachomatis y N. gonorrhoeae a las cuales les hacen pruebas rápidas en el sitio de atención
Origen del dato	Historia clínica – Registros de las ordenes de exámenes

II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

Fórmula del indicador		Factor	Unidad de medida	Explicación de la variable	Fuente potencial de información
Numerador	Número de mujeres con factores de riesgo para C. trachomatis y N. gonorrhoeae a las cuales les realizaron pruebas rápidas	100	Proporción	Indica el número de mujeres que presentan factores de riesgo (definidos en la GPC de ITS, 2 o más puntos en la evaluación de factores de riesgo) para C. trachomatis y N. gonorrhoeae a las cuales les realizaron pruebas rápidas en el sitio de atención	Historia clínica
Denominador	Número total de mujeres con factores de riesgo para C. trachomatis y N. gonorrhoeae			Indica el total de mujeres con factores de riesgo (definidos en la GPC de ITS) para C. trachomatis y N. gonorrhoeae	Historia clínica

Alertas/problemas/limitaciones para el cálculo del indicador

III. CATEGORIZACIÓN Y PERIODICIDAD

Categoría	Proceso
Categoría Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC)	Calidad de la atención en salud
Periodicidad	Mensual

Observaciones

Elaborado: junio/2014

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Manejo sintomático de pacientes con sospecha de síndrome de infección cervical
Definición del indicador	Proporción de pacientes con sospecha de síndrome de infección cervical a las cuales se les prescribe Azitromicina 1 gr más Ceftriaxona 500 mg
Objetivo del indicador	Identificar el número de pacientes con sospecha de síndrome de infección cervical a las cuales se prescribe Azitromicina 1 gr más Ceftriaxona 500 mg
Origen del dato	Historia clínica – Registros de las ordenes de medicamentos

II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

Fórmula del indicador		Factor	Unidad de medida	Explicación de la variable	Fuente potencial de información
Numerador	Número de mujeres con sospecha de infección cervical a las cuales les prescribieron Azitromicina 1 gr más Ceftriaxona 500 mg	100	Proporción	Indica el número de mujeres que fueron atendidas por sospecha de infección cervical (CIE 10: N72X, A638, A64X) y a las cuales les prescribieron Azitromicina 1 gr más Ceftriaxona 500 mg en el periodo de análisis	Historia clínica y RIPS
Denominador	Número total de mujeres con sospecha de infección cervical			Indica el total de mujeres atendidas por sospecha de infección cervical (CIE 10: N72X, A638, A64X) en el periodo de análisis	RIPS

Alertas/problemas/limitaciones para el cálculo del indicador

III. CATEGORIZACIÓN Y PERIODICIDAD

Categoría	Proceso
Categoría Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC)	Calidad de la atención en salud
Periodicidad	Mensual

Observaciones

Elaborado: junio/2014

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Manejo sintomático de los contactos sexuales de pacientes con sospecha de síndrome de infección cervical
Definición del indicador	Proporción de consultas en las cuales se prescribió a los contactos sexuales de las pacientes con sospecha de síndrome de infección cervical, Azitromicina 1 gr más Cefexime 400 mg
Objetivo del indicador	Identificar el número de consultas en las cuales se prescribe a los contactos sexuales de las pacientes con sospecha de síndrome de infección cervical, Azitromicina 1 gr más Cefexime 400 mg
Origen del dato	Historia clínica – Registros de las ordenes de medicamentos

II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

Fórmula del indicador		Factor	Unidad de medida	Explicación de la variable	Fuente potencial de información
Numerador	Número de consultas en las cuales se prescribió a los contactos sexuales de las pacientes con sospecha de síndrome de infección cervical, Azitromicina 1 gr más Cefexime 400 mg	100	Proporción	Indica el número de consultas en las cuales se prescribió a los contactos sexuales de las pacientes con sospecha de síndrome de infección cervical (CIE 10: N72X, A638, A64X), Azitromicina 1 gr más Cefexime 400 mg	Historia clínica
Denominador	Número total de consultas a pacientes con sospecha de síndrome de infección cervical			Indica el número total de consultas realizadas a pacientes con sospecha de síndrome de infección cervical (CIE 10: N72X, A638, A64X)	RIPS

Alertas/problemas/limitaciones para el cálculo del indicador

III. CATEGORIZACIÓN Y PERIODICIDAD

Categoría	Proceso
Categoría Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC)	Calidad de la atención en salud
Periodicidad	Mensual

Observaciones

Elaborado: junio/2014

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Manejo sintomático de pacientes con sospecha de síndrome de descarga uretral
Definición del indicador	Proporción de pacientes con sospecha de síndrome de descarga uretral a los cuales se les prescribe Azitromicina 1 gr más Ceftriaxona 500 mg más Tinidazol 500 mg
Objetivo del indicador	Identificar el número de pacientes con sospecha de síndrome de descarga uretral a los cuales se prescribe Azitromicina 1 gr más Ceftriaxona 500 mg más Tinidazol 500 mg
Origen del dato	Historia clínica – Registros de las ordenes de medicamentos

II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

Fórmula del indicador		Factor	Unidad de medida	Explicación de la variable	Fuente potencial de información
Numerador	Número de hombres con sospecha de síndrome de descarga uretral a los cuales les prescribieron Azitromicina 1 gr más Ceftriaxona 500 mg más Tinidazol 500 mg	100	Proporción	Indica el número de hombres con sospecha de síndrome de descarga uretral (CIE 10: R36X, A638, A64X) a los cuales les prescribieron Azitromicina 1 gr más Ceftriaxona 500 mg más Tinidazol 500 mg	Historia clínica y RIPS
Denominador	Número total de hombres con sospecha de síndrome de descarga uretral			Indica el número de hombres que fueron atendidos por sospecha de síndrome de descarga uretral (CIE 10: R36X, A638, A64X)	RIPS

Alertas/problemas/limitaciones para el cálculo del indicador

III. CATEGORIZACIÓN Y PERIODICIDAD

Categoría	Proceso
Categoría Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC)	Calidad de la atención en salud
Periodicidad	Mensual

Observaciones

Elaborado: junio/2014

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Manejo sintomático de los contactos sexuales de pacientes con sospecha de síndrome de descarga uretral
Definición del indicador	Proporción de consultas en las cuales se prescribió a los contactos sexuales de los pacientes con sospecha de síndrome de descarga uretral Azitromicina 1 gr más Cefexime 400 mg más Tinidazol 2 gr
Objetivo del indicador	Identificar el número de consultas en las cuales se prescribe a los contactos sexuales de los pacientes con sospecha de síndrome de descarga uretral Azitromicina 1 gr más Cefexime 400 mg
Origen del dato	Historia clínica – Registros de las ordenes de medicamentos

II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

Fórmula del indicador		Factor	Unidad de medida	Explicación de la variable	Fuente potencial de información
Numerador	Número de consultas en las cuales se prescribió a los contactos sexuales de los pacientes con sospecha de síndrome de descarga uretral, Azitromicina 1 gr más Cefexime 400 mg más Tinidazol 2 gr	100	Proporción	Indica el número de consultas en las cuales se prescribió a los contactos sexuales de los pacientes con sospecha de síndrome de descarga uretral (CIE 10: R36X, A638, A64X), Azitromicina 1 gr más Cefexime 400 mg más Tinidazol 2 gr	Historia clínica
Denominador	Número total de consultas a pacientes con sospecha de síndrome de descarga uretral			Indica el número total de consultas realizadas a pacientes con sospecha de síndrome de descarga uretral (CIE 10: R36X, A638, A64X)	RIPS

Alertas/problemas/limitaciones para el cálculo del indicador

--

III. CATEGORIZACIÓN Y PERIODICIDAD

Categoría	Proceso
Categoría Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC)	Calidad de la atención en salud
Periodicidad	Mensual

Observaciones

--

Elaborado: junio/2014

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Manejo sintomático de los contactos sexuales de pacientes con sospecha de síndrome de descarga uretral
Definición del indicador	Proporción de consultas en las cuales se prescribió a los contactos sexuales de los pacientes con sospecha de síndrome de descarga uretral Azitromicina 1 gr más Cefexime 400 mg más Tinidazol 2 gr
Objetivo del indicador	Identificar el número de consultas en las cuales se prescribe a los contactos sexuales de los pacientes con sospecha de síndrome de descarga uretral Azitromicina 1 gr más Cefexime 400 mg
Origen del dato	Historia clínica – Registros de las ordenes de medicamentos

II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

Fórmula del indicador		Factor	Unidad de medida	Explicación de la variable	Fuente potencial de información
Numerador	Número de consultas en las cuales se prescribió a los contactos sexuales de los pacientes con sospecha de síndrome de descarga uretral, Azitromicina 1 gr más Cefexime 400 mg más Tinidazol 2 gr	100	Proporción	Indica el número de consultas en las cuales se prescribió a los contactos sexuales de los pacientes con sospecha de síndrome de descarga uretral (CIE 10: R36X, A638, A64X), Azitromicina 1 gr más Cefexime 400 mg más Tinidazol 2 gr	Historia clínica
Denominador	Número total de consultas a pacientes con sospecha de síndrome de descarga uretral			Indica el número total de consultas realizadas a pacientes con sospecha de síndrome de descarga uretral (CIE 10: R36X, A638, A64X)	RIPS

Alertas/problemas/limitaciones para el cálculo del indicador

--

III. CATEGORIZACIÓN Y PERIODICIDAD

Categoría	Proceso
Categoría Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC)	Calidad de la atención en salud
Periodicidad	Mensual

Observaciones

--

Elaborado: junio/2014

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Manejo sintomático de los contactos sexuales de pacientes con sospecha de síndrome de úlcera genital
Definición del indicador	Proporción de pacientes con sospecha de síndrome de úlcera genital a los cuales se les prescribe Penicilina G Benzatinica 2.400.000 UI más Azitromicina
Objetivo del indicador	Identificar el número de pacientes con sospecha de síndrome de úlcera genital a los cuales se prescribe Penicilina G Benzatinica 2.400.000 UI más Azitromicina
Origen del dato	Historia clínica – Registros de las ordenes de medicamentos

II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

Fórmula del indicador		Factor	Unidad de medida	Explicación de la variable	Fuente potencial de información
Numerador	Número de pacientes con sospecha de síndrome de úlcera genital a los cuales les prescribieron Penicilina G Benzatinica 2.400.00 UI más Azitromicina	100	Proporción	Indica el número de pacientes con sospecha de síndrome de úlcera genital (CIE 10: N485, N765, N766, N770, N771, N778, A630, A638, A64X) a los cuales les prescribieron Penicilina G Benzatinica 2.400.00 UI más Azitromicina	Historia clínica y RIPS
Denominador	Número total de pacientes con síndrome de úlcera genital			Indica el número de pacientes con síndrome de úlcera genital (CIE 10: N485, N765, N766, N770, N771, N778, A630, A638, A64X)	RIPS

Alertas/problemas/limitaciones para el cálculo del indicador

III. CATEGORIZACIÓN Y PERIODICIDAD

Categoría	Proceso
Categoría Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC)	Calidad de la atención en salud
Periodicidad	Mensual

Observaciones

Elaborado: junio/2014

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Manejo sintomático de pacientes con sospecha de síndrome de flujo vaginal
Definición del indicador	Proporción de pacientes con síndrome de flujo vaginal a las cuales se les prescribe Tinidazol 2 gr
Objetivo del indicador	Identificar el número de pacientes con sospecha de flujo vaginal genital a los cuales se prescribe Tinidazol 2 gr
Origen del dato	Historia clínica – Registros de las ordenes de medicamentos

II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

Fórmula del indicador		Factor	Unidad de medida	Explicación de la variable	Fuente potencial de información
Numerador	Número de pacientes con sospecha de síndrome de flujo vaginal a los cuales les prescribieron Tinidazol 2 gr	100	Proporción	Indica el número de pacientes con sospecha de síndrome de flujo vaginal (CIE 10: N898, A638, A64X) a los cuales les prescribieron Tinidazol 2 gr	Historia clínica y RIPS
Denominador	Número total de pacientes con síndrome de flujo vaginal			Indica el número de pacientes con síndrome de flujo vaginal (CIE 10: N898, A638, A64X)	RIPS

Alertas/problemas/limitaciones para el cálculo del indicador

III. CATEGORIZACIÓN Y PERIODICIDAD

Categoría	Proceso
Categoría Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC)	Calidad de la atención en salud
Periodicidad	Mensual

Observaciones

Elaborado: junio/2014

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Manejo sintomático de los contactos sexuales de pacientes con sospecha de síndrome de flujo vaginal
Definición del indicador	Proporción de consultas en las cuales se prescribió a los contactos sexuales de las pacientes con sospecha de síndrome de flujo vaginal tratamiento simultáneo con Tinidazol 2 gr
Objetivo del indicador	Identificar el número de consultas en las cuales se prescribe a los contactos sexuales de los pacientes con sospecha de síndrome de flujo vaginal, Tinidazol 2 gr
Origen del dato	Historia clínica – Registros de las ordenes de medicamentos

II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

Fórmula del indicador		Factor	Unidad de medida	Explicación de la variable	Fuente potencial de información
Numerador	Número de consultas en las cuales se prescribió a los contactos sexuales de los pacientes con sospecha de síndrome de flujo vaginal, Tinidazol 2 gr	100	Proporción	Indica el número de consultas en las cuales se prescribió a los contactos sexuales de los pacientes con sospecha de síndrome de flujo vaginal (CIE 10: N898, A638, A64X), Tinidazol 2 gr	Historia clínica
Denominador	Número total de consultas a pacientes con sospecha de síndrome de flujo vaginal			Indica el número total de consultas realizadas a pacientes con sospecha de síndrome de flujo vaginal (CIE 10: N898, A638, A64X)	RIPS

Alertas/problemas/limitaciones para el cálculo del indicador

III. CATEGORIZACIÓN Y PERIODICIDAD

Categoría	Proceso
Categoría Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC)	Calidad de la atención en salud
Periodicidad	Mensual

Observaciones

Elaborado: junio/2014

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Manejo sintomático de pacientes con sospecha de síndrome de EPI
Definición del indicador	Proporción de pacientes con EPI a los cuales se prescribió Ceftriaxona más Azitromicina más Metronidazol 500 mg
Objetivo del indicador	Identificar el número de pacientes con sospecha de EPI genital a los cuales se prescribe Ceftriaxona más Metronidazol 500 mg
Origen del dato	Historia clínica – Registros de las ordenes de medicamentos

II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

Fórmula del indicador		Factor	Unidad de medida	Explicación de la variable	Fuente potencial de información
Numerador	Número de pacientes con sospecha de síndrome de EPI a los cuales les prescribieron Ceftriaxona más Azitromicina más Metronidazol 500 mg	100	Proporción	Indica el número de pacientes con sospecha de síndrome de EPI (CIE 10: N70 - N77) a los cuales les prescribieron Ceftriaxona más Azitromicina más Metronidazol 500 mg	Historia clínica y RIPS
Denominador	Número total de pacientes con síndrome de EPI			Indica el número de pacientes con síndrome de EPI (CIE 10: N70 - N77)	RIPS

Alertas/problemas/limitaciones para el cálculo del indicador

III. CATEGORIZACIÓN Y PERIODICIDAD

Categoría	Proceso
Categoría Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC)	Calidad de la atención en salud
Periodicidad	Mensual

Observaciones

Elaborado: junio/2014

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Manejo sintomático de los contactos sexuales de pacientes con sospecha de síndrome de EPI
Definición del indicador	Proporción de consultas en las cuales se prescribió a los contactos sexuales de las pacientes con síndrome de EPI, Azitromicina 1 gr más Cefixime 400 mg
Objetivo del indicador	Identificar el número de consultas en las cuales se prescribe a los contactos sexuales de los pacientes con sospecha de síndrome de EPI, Azitromicina 1 gr más Cefixime 400 mg
Origen del dato	Historia clínica – Registros de las ordenes de medicamentos

II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

Fórmula del indicador		Factor	Unidad de medida	Explicación de la variable	Fuente potencial de información
Numerador	Número de consultas en las cuales se prescribió a los contactos sexuales de los pacientes con sospecha de síndrome de EPI, Azitromicina 1 gr más Cefixime 400 mg	100	Proporción	Indica el número de consultas en las cuales se prescribió a los contactos sexuales de los pacientes con sospecha de síndrome de EPI (CIE 10: N898, A638, A64X), Azitromicina 1 gr más Cefixime 400 mg	Historia clínica
Denominador	Número total de consultas a pacientes con sospecha de síndrome de EPI			Indica el número total de consultas realizadas a pacientes con sospecha de síndrome de EPI (CIE 10: N898, A638, A64X)	RIPS

Alertas/problemas/limitaciones para el cálculo del indicador

III. CATEGORIZACIÓN Y PERIODICIDAD

Categoría	Proceso
Categoría Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC)	Calidad de la atención en salud
Periodicidad	Mensual

Observaciones

Elaborado: junio/2014

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Entrega de medicamento para el manejo sintomático, el mismo día de la consulta
Definición del indicador	Proporción de pacientes que recibieron el medicamento para el manejo sintomático el mismo día de la consulta
Objetivo del indicador	Identificar el número de pacientes que reciben tratamiento para el manejo sintomático el mismo día de la consulta
Origen del dato	Historia clínica – Registros de las ordenes de medicamentos

II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

Fórmula del indicador		Factor	Unidad de medida	Explicación de la variable	Fuente potencial de información
Numerador	Número de pacientes que recibieron el medicamento para el manejo sintomático el mismo día de la consulta	100	Proporción	Indica el número de pacientes que recibieron el medicamento prescrito por el médico tratante el mismo día de la consulta	Historia clínica y RIPS
Denominador	Número total de pacientes que consultaron por algún síndrome de ITS			Indica el total de pacientes que fueron atendidos por algún síndrome de ITS (CIE 10: N72X, A64X, R36X, A638, N485, N765, N766, N770, N771, N778, A630, N898, N70 - N77) durante el periodo de análisis	RIPS

Alertas/problemas/limitaciones para el cálculo del indicador

--

III. CATEGORIZACIÓN Y PERIODICIDAD

Categoría	Proceso
Categoría Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC)	Calidad de la atención en salud
Periodicidad	Mensual

Observaciones

--

Elaborado: junio/2014